GUÍA 3: ESPACIOS VECTORIALES

1. Escriba las definiciones de vector de n componentes, de conjunto $\mathbb{R}^n$ y de suma de vectores y producto de un escalar por un vector de $\mathbb{R}^n$. Enuncie las propiedades de la suma de vectores de $\mathbb{R}^n$ y del producto de un escalar por un vector de $\mathbb{R}^n$.
2. Defina espacio vectorial (real).
3. Indique cuáles son las “operaciones habituales (estándar) de suma y producto por escalar”, el “elemento nulo” y el “elemento opuesto” en cada uno de los siguientes conjuntos:

$$\mathbb{R}^n = \{\mathbf{x} : \mathbf{x} \text{ es un vector de } n \text{ componentes reales}\}$$

$$\mathbb{M}_{m \times n} = \{A : A \text{ es una matriz } m \times n\}$$

$$\mathbb{M}_n = \{A : A \text{ es una matriz cuadrada de orden } n\}$$

$$\mathbb{P} = \{p : p = p(x) \text{ es un polinomio en la variable } x\}$$

$$\mathbb{P}_n = \{p : p = p(x) \text{ es un polinomio de grado menor o igual a } n\} \cup \{0\}$$

$$\mathbb{F}(\mathbb{R}) = \{f : f \text{ es una función de } \mathbb{R} \text{ en } \mathbb{R}\}$$

$$\mathcal{C}[a, b] = \{f : f \text{ es una función continua en } [a, b]\}$$

Recuerde: $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{M}_{m \times n}$, $\mathbb{M}_n$, $\mathbb{P}$, $\mathbb{P}_n$, $\mathbb{F}(\mathbb{R})$ y $\mathcal{C}[a, b]$ con las operaciones habituales (estándar) de suma y producto por escalar definidos en cada uno, son ejemplos de espacios vectoriales.

4. En el conjunto $\mathbb{R}^2$ considere la suma habitual y el producto por escalar siguiente:

$$c(u_1, u_2) = (cu_1, 0),$$

donde c es una constante real y (u_1, u_2) un vector de $\mathbb{R}^2$. ¿Es este conjunto con esas operaciones un espacio vectorial?, justifique.

5. Escriba la definición de subespacio. Enuncie el teorema de caracterización de un subespacio.
6. ¿A qué se llaman subespacios triviales y subespacios propios? Dé un ejemplo de un subespacio propio de $\mathbb{P}_2$.
7. Determine la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones. Justifique su respuesta:
 - (a) Si U y W son subespacios de $\mathbb{V}$ entonces $U \cap W$ es subespacio de $\mathbb{V}$.
 - (b) Sean U y W subconjuntos del espacio vectorial $\mathbb{V}$. Si $U \cap W$ es subespacio de $\mathbb{V}$ entonces U y W son subespacios de $\mathbb{V}$.
 - (c) Si U y W son subespacios de $\mathbb{V}$ entonces $U \cup W$ es subespacio de $\mathbb{V}$.
8. Defina combinación lineal, conjunto generado y conjunto generador. ¿El conjunto $\{1 + x, -x + x^2\}$ genera a $\mathbb{P}_2$?, justifique.

9. Sea $\mathbb{V}$ un espacio vectorial y $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ un subconjunto de $\mathbb{V}$. Demuestre los siguientes teoremas:
- $\text{gen}(S)$ es subespacio de $\mathbb{V}$.
 - Si $\mathbb{V}$ está generado por S y uno de los vectores de S se puede escribir como combinación lineal de los restantes vectores de S , entonces si se elimina dicho vector los $k - 1$ vectores restantes siguen generando a $\mathbb{V}$.
10. Defina conjuntos li y ld. Dé un ejemplo de un conjunto li y otro ld del espacio $\mathbb{M}_{2 \times 3}$.
11. Demuestre:
- Un subconjunto $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ del espacio vectorial $\mathbb{V}$ es ld si y sólo si al menos un vector de S es combinación lineal de los restantes vectores de S .
 - El subconjunto $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}\}$ del espacio vectorial V es ld si y sólo si existe $\alpha \in \mathbb{R}$ tal que $\mathbf{u} = \alpha \mathbf{v}$.
 - Si S es un subconjunto del espacio vectorial $\mathbb{V}$ que contiene al vector cero, entonces S es ld.
12. Escriba la definición de base de un espacio vectorial. Indique cuáles son las bases estándar de los espacios vectoriales finito dimensionales dados en (3).
13. Demuestre el siguiente teorema: Sea $S = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$ un subconjunto del espacio vectorial $\mathbb{V}$. Entonces S es una base de $\mathbb{V}$ si y sólo si todo vector de $\mathbb{V}$ se escribe de manera única como combinación lineal de los vectores de S .
14. Defina dimensión de un espacio vectorial. Indique las dimensiones de los espacios vectoriales finito dimensionales dados en (3). Obtenga la dimensión del subespacio $V = \{p = p(x) \in \mathbb{P}_2 : p(0) = p(1)\}$ de $\mathbb{P}_2$.
15. Sea S un subconjunto de n vectores de un espacio vectorial $\mathbb{V}$ de dimensión n . Demuestre que:
- Si S es li entonces S es una base de $\mathbb{V}$.
 - Si S genera a $\mathbb{V}$ entonces S es una base de $\mathbb{V}$.
16. Sea $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ un conjunto generador del espacio vectorial $\mathbb{V}$ de dimensión 3. Demuestre que el conjunto $\{2\mathbf{u}, 2\mathbf{u} - \mathbf{v}, \mathbf{u} + 2\mathbf{v} - 3\mathbf{w}\}$ es una base de $\mathbb{V}$.
17. Defina los tres espacios fundamentales de una matriz $m \times n$. ¿De qué espacios son subespacios cada uno de ellos?, justifique su respuesta.
18. Defina rango y nulidad de una matriz. Enuncie el teorema del rango y ejemplifíquelo.
19. Demuestre:
- Si $\mathbf{x}_p$ es una solución particular del sistema lineal no homogéneo $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, entonces toda solución de ese sistema puede escribirse como $\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$ donde $\mathbf{x}_h$ es una solución del sistema homogéneo asociado $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.
 - $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente si y sólo si $\mathbf{b}$ es un vector del espacio de columnas de A .
 - $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ es consistente si y sólo si el rango de A y el de $[A : \mathbf{b}]$ son iguales.
20. Defina vector de coordenadas y matriz de cambio de base en $\mathbb{R}^n$. Demuestre que si P es la matriz de transición (cambio de base) de la base B' a la base B en $\mathbb{R}^n$, entonces P es invertible y la matriz de transición de B a B' es P^{-1} .