

GUIA DE ESTUDIO: "EL PLANO"

Esta guía tiene la intención de ayudarte en el aprendizaje de los contenidos desarrollados en el material de estudio "El plano" (autor: Ing. Ricardo Sagristá). Tales contenidos corresponden a la Unidad 2 del Programa Analítico de la Asignatura.

En esta unidad iniciarás el estudio de una superficie: "el plano".

*Encontrarás diferentes formas de la ecuación de un plano,
cada una de ellas con un interés particular.*

*Notarás también ciertas analogías con las ecuaciones de una recta en el plano
y con algunas propiedades métricas tales como el cálculo de ángulos y distancias.*

En las actividades propuestas se presentan problemas (numerados del 1 al 15), cuyas respuestas se encuentran al final de la guía.

❖ **Actividad 1:**

Dibuja en un sistema de ejes cartesianos ortogonales en el espacio un vector no nulo \vec{n} y un punto P_1 . Luego representa al *único* plano que contiene al punto y es perpendicular al vector \vec{n} .

Dicho plano, además de P_1 , está formado por todos los puntos P del espacio que determinan con P_1 vectores perpendiculares a \vec{n} .

❖ **Actividad 2:**

- Realiza una lectura del material didáctico desde *Definición del plano como lugar geométrico* hasta *Ecuación general del plano*.

1. Encuentra una ecuación y esboza la gráfica del plano que contiene al punto P y es perpendicular al vector \vec{n} , cuando:

- a) $P(1,2,3)$ y $\vec{n} = \vec{i}$
- b) $P(1,2,3)$ y $\vec{n} = \vec{i} + \vec{j}$
- c) $P(1,2,3)$ y $\vec{n} = \vec{j} + \vec{k}$
- d) $P(1,2,3)$ y $\vec{n} = \vec{i} + \vec{j} + \vec{k}$


❖ **Actividad 3:**

- Continúa con la lectura de los párrafos :
 - 2.1.1. Significado de los coeficientes de la ecuación general de un plano
 - 2.1.2. Ecuación normalizada de un plano
 - 2.1.3. Casos particulares
 - 2.2. Trazas de un plano
 - 2.3. Forma segmentaria de la ecuación de un plano
 5. Ecuación de un plano que pasa por tres puntos dados (pág 16).

- Resuelve:
- 2. El pie de la perpendicular trazada desde el punto $A(3,6,2)$ a un plano es el punto $B(1,2,6)$. Halla una ecuación de dicho plano y encuentra las coordenadas de los puntos donde intercepta a los ejes coordenados.
- 3. a) Halla una ecuación del plano que contiene a los puntos: $A(1,2,3)$, $B(2,3,4)$ y $C(-1,7,-2)$
 b) Escribe su forma segmentaria y representa gráficamente.
 c) Escribe una ecuación normalizada del plano e interpreta el significado del término independiente.
- 4. Los puntos $O(0,0,0)$, $A(3,0,0)$, $B(0,2,0)$ y $C(0,0,6)$ son vértices de un paralelepípedo. Sabiendo que los segmentos OA , OB y OC determinan tres aristas del mismo, encuentra:
 a) las coordenadas de los restantes vértices,
 b) las ecuaciones de los planos que contienen a las caras del paralelepípedo.
- 5. Halla una ecuación del plano que contiene a los puntos $P(2,1,-1)$ y $Q(-1,0,3)$, y que es perpendicular al plano de ecuación $-x+2y+z=5$.
 ¿Qué condición deben verificar P y Q para que no haya solución única?
- 6. Halla una ecuación del plano que contiene al punto $P(2,3,-1)$ y que es simultáneamente perpendicular a los planos de ecuaciones $x+2y+4z-4=0$ y $3x+y-2z=7$.

❖ **Ecuaciones paramétricas de un plano**

Fijado en el espacio un sistema de ejes cartesianos ortogonales y dados tres puntos $P(x_1, y_1, z_1)$, $Q(x_2, y_2, z_2)$ y $R(x_3, y_3, z_3)$ no alineados, existe un único plano π que contiene a dichos puntos.



Sea $P(x, y, z)$ un punto cualquiera del plano π .

$$P(x, y, z) \in \pi \Leftrightarrow \overline{P_1P} \text{ es combinación lineal de los vectores } \overline{P_1P_2} \text{ y } \overline{P_1P_3} \Leftrightarrow$$

$$\text{existen escalares } s \text{ y } t \text{ tal que } \overline{P_1P} = s \overline{P_1P_2} + t \overline{P_1P_3}$$

Pasando a componentes se tiene que:

$$P(x, y, z) \in \pi \Leftrightarrow \text{existen escalares } s \text{ y } t \text{ tal que}$$

$$\begin{cases} x - x_1 = s(x_2 - x_1) + t(x_3 - x_1) \\ y - y_1 = s(y_2 - y_1) + t(y_3 - y_1) \\ z - z_1 = s(z_2 - z_1) + t(z_3 - z_1) \end{cases}$$

En síntesis:

$$\begin{cases} x = x_1 + s(x_2 - x_1) + t(x_3 - x_1) \\ y = y_1 + s(y_2 - y_1) + t(y_3 - y_1) \\ z = z_1 + s(z_2 - z_1) + t(z_3 - z_1) \end{cases} \quad \text{con } s, t \in \mathbb{R}$$

son unas ecuaciones paramétricas de un plano.

- **Observa que:**
 - i) (x_1, y_1, z_1) son las coordenadas de un punto del plano.
 - ii) $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$ y $(x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1)$ son las componentes de dos vectores paralelos al plano y no paralelos entre sí.
7. a) Encuentra las ecuaciones paramétricas del plano que contiene al origen de coordenadas y es paralelo a los vectores $\bar{u} = (1, 2, 1)$ y $\bar{v} = (1, 0, 3)$.
- b) Obtiene, a partir de las ecuaciones paramétricas, una ecuación general cartesiana.

❖ **Actividad 4:**

Se tratan aquí problemas de la Geometría Métrica, es decir cálculo de ángulos y distancias.

- Lee atentamente los párrafos:
 3. Ángulo que forman entre sí dos planos
 - 3.1. Condición de perpendicularidad entre planos
 - 3.2. Condición de paralelismo entre planos
 - 3.2.1. Planos coincidentes
 4. Distancia de un punto a un plano
 - 4.1. Distancia entre dos planos paralelos
- Resuelve:
 8. Determina α para que los planos $\pi) x + 2y + z = 1$ y $\sigma) 2x + \alpha y + 2z = 5$ sean:
 - a) perpendiculares,
 - b) paralelos. En este caso calcula la distancia entre los mismos.
 9. Halla una ecuación del plano que es paralelo al plano de ecuación $-5x + y - 2z + 8 = 0$, sabiendo que ambos planos equidistan del punto $P(-1, 1, 4)$.
 10. Determina los ángulos que forman los planos $\pi) x + y = 1$ y $\sigma) y + z = 2$.
 11. Halla el coseno del ángulo agudo que forman los planos de ecuaciones $x - 3y + z = 4$ y $2x + y + 7z = 1$.

❖ **Actividad 5:**

- Continúa con la lectura de *Intersección de tres planos*, obviando los dos ejemplos finales.

*Desde un punto de vista algebraico,
la intersección de tres planos requiere la resolución de
un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas.*

La resolución de sistemas de ecuaciones lineales es objeto de estudio en el curso de Álgebra y Geometría II. Por tal motivo te proponemos que sólo tengas en cuenta las consideraciones geométricas.

- Resuelve los problemas:
- 12.** Analiza si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Justifica.

Atención:

Tus justificaciones *deben* ser más amplias que las dadas en las respuestas.
¡Ellas te permitirán controlar tus fundamentaciones!

- Los puntos $A(5,1,1)$, $B(-1,-2,1)$, $C(3,3,3)$ y $D(16,-1,-4)$ son coplanares.
 - $x + y = 0 \quad \forall z$ es una ecuación del plano coordenado XY .
 - La ecuación $(8x + y + z) \cdot (x - y + z - 2) = 0$ representa un par de planos que se interceptan en una recta en el espacio.
 - El plano de ecuación $-3x + 2y + 5z = 2$ se encuentra a dos unidades del origen de coordenadas.
 - Los planos de ecuaciones $x + y + z = 1$ y $2x + 2y + 2z = 2$ no tienen puntos en común.
 - Los puntos $A(2,1,5)$, $B(8,-2,0)$ y $C(14,-5,-5)$ determinan un único plano.
 - La ecuación $x \cdot y \cdot z = 0$ se satisface para todos los puntos de los planos coordenados.
 - $x - 3y + 8z - 15 = 0$ es una ecuación de un plano perpendicular al segmento de extremos $A(3,2,-7)$ y $B(5,-4,9)$ que contiene al punto medio del segmento.
 - $z = 9$, cualesquiera sean x e y , es una ecuación del plano perpendicular al eje Z que contiene al punto $A(-4,2,9)$.
 - Si dos planos son paralelos, sus trazas sobre cualquiera de los planos coordenados son dos rectas paralelas.
 - $3x + 4z = 0 \quad \forall y$ es una ecuación de un plano que contiene al eje Y y al punto $P(8,4,-6)$.
- 13.** Halla el volumen del tetraedro formado por el plano $6x + 7y + 14z - 42 = 0$ y los planos coordenados.
- 14.** Construye el prisma triangular formado por los planos coordenados y por los planos de ecuaciones $x + 2y - 4 = 0$ y $z - 5 = 0$. Calcula su volumen.
- 15.** Halla y reconoce la ecuación del lugar geométrico de los puntos del espacio que equidistan de los puntos $A(1,1,1)$ y $B(3,3,3)$.

❖ RESPUESTAS

1. a) $x=1$ b) $x+y-3=0$ c) $y+z-5=0$ d) $x+y+z-6=0$
2. $x+2y-2z-7=0$ $I_x(-7,0,0)$ $I_y(0,-\frac{7}{2},0)$ $I_z(0,0,\frac{7}{2})$
3. a) $-10x+3y+7z-17=0$ b) $\frac{x}{-\frac{17}{10}} + \frac{y}{\frac{17}{3}} + \frac{z}{\frac{17}{7}} = 1$
- c) $\frac{-10x+3y+7z-17}{\sqrt{158}} = 0$, $\frac{17}{\sqrt{158}}$ representa la distancia del plano al origen de coordenadas.
4. a) $D(3,2,0)$, $E(3,0,6)$, $F(0,2,6)$ y $G(3,2,6)$.
 b) $x=0 \quad \forall y, \forall z$ $x=3 \quad \forall y, \forall z$ $y=0 \quad \forall x, \forall z$
 $y=2 \quad \forall x, \forall z$ $z=0 \quad \forall x, \forall y$ $z=6 \quad \forall x, \forall y$
5. $-9x-y-7z+12=0$. Si P y Q son los extremos de un vector paralelo al vector $\vec{n} = (-1,2,5)$ entonces el problema admite "infinitas" soluciones.
6. $-8x+14y-5z-31=0$
7. a) $\begin{cases} x = s+t \\ y = 2s \\ z = s+3t \end{cases} \quad s, t \in \mathfrak{R}$ b) $3x-y-z=0$
8. a) $\alpha = -2$ b) $\alpha = 4$ $d = \frac{3}{\sqrt{24}}$
9. $-5x+y-2z-4=0$
10. $\frac{\pi}{3}$ y $\frac{2\pi}{3}$
11. $\frac{6}{\sqrt{594}}$
12. a) V . Las coordenadas del punto D satisfacen la ecuación del plano determinado por los puntos A , B y C . También puede justificarse a través del producto mixto.
 b) F . Se trata de un plano proyectante sobre el plano coordenado XY que contiene al eje Z .
 c) V . El producto de dos factores es igual a cero cuando al menos uno de los mismos es igual a cero. La ecuación representa un par de planos no paralelos ni coincidentes que se interceptan en una recta.
 d) F . La distancia al origen de coordenadas es igual a $\frac{2}{\sqrt{38}}$

- e) *F*. Las ecuaciones dadas son equivalentes, es decir tienen el mismo conjunto solución. Por lo tanto representan a un mismo plano.
- f) *F*. Los puntos están alineados, es decir pertenecen a una misma recta. Por lo tanto existen “infinitos” planos que los contienen.
- g) *V*. El producto de tres factores es igual a cero cuando al menos uno de los mismos es igual a cero.
- h) *V*. El vector determinado por los puntos $A(3,2,-7)$ y $B(5,-4,9)$ es perpendicular al plano y el punto medio $M(4,-1,1)$ satisface la ecuación.
- i) *V*. El plano es paralelo al coordenado XY , por lo tanto todos sus puntos tienen la tercera coordenada constante. Siendo $A(-4,2,9)$ un punto del plano, su ecuación es $z=9$ cualesquiera sean x e y .
- j) *V*. Surge inmediatamente de escribir las ecuaciones de los planos y sus trazas.
- k) *V*. Las coordenadas del punto P y las coordenadas de todos los puntos del eje Y satisfacen la ecuación dada.

13. 21

14. 20

15. es un plano de ecuación $x + y + z - 6 = 0$.